

Boletim Hidroclimático Sazonal do Amazonas



ISSN: 3085-6884

v. 3 n. 10

Data de publicação: 27/05/2025

Prognóstico: Junho, Julho e Agosto /2025

DOI: <https://doi.org/10.59666/boletimhsa.v3i10>



editora
UEA



LABCLIM
LABORATÓRIO DE MODELAGEM DO
SISTEMA CLIMÁTICO TERRESTRE



UEA
UNIVERSIDADE
DO ESTADO DO
AMAZONAS



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Boletim Hidroclimático

Sazonal do Amazonas

Coordenação Geral

Dr. Francis Wagner Silva Correia – Responsável Técnico do Laboratório de Modelagem do Sistema Climático Terrestre (LABCLIM/UEA)

Editores

Dr. Leonardo Alves Vergasta – Meteorologista

Dr. Wesley de Brito Gomes – Meteorologista

Me. Djanir Sales de Moraes – Meteorologista

Luciana da Silva Loureiro- Geógrafa

Fábio Nunes de Souza – Acadêmico em Meteorologia

Bianca Souza Oliveira – Acadêmica em Meteorologia

Larissa dos Santos Lima – Acadêmica em Meteorologia

Diogo Gomes dos Santos– Acadêmico em Engenharia de Computação

Marcio Luiz Rosas Murad de Souza– Acadêmico em Meteorologia

Apoio Técnico

Gerson Farias Briglia – Analista de Tecnologia da Informação (Data Center)

Contato

Universidade do Estado do Amazonas – UEA

Escola Superior de Tecnologia – EST

Av. Darcy Vargas, 1.200 – Parque Dez de Novembro, Manaus – AM, 69050-020

Francis Wagner – fcorreia@uea.edu.br

Wesley Gomes – wbg.dcl18@uea.edu.br

Leonardo Vergasta – lav.dcl18@uea.edu.br

Djanir Sales - dsm.dcl23@uea.edu.br

Fabio Nunes – fnds.mtr22@uea.edu.br

Bianca Souza – bso.mtr20@uea.edu.br

Gerson Farias – gerson@uea.edu.br

Larissa Lima – ldslm.mtr24@uea.edu.br

Diogo Gomes - dgds.eng22@uea.edu.br

Marcio Luiz- mlrmdso.mtr24@uea.edu.br

Luciana Loureiro- lucianaloureiro15@gmail.com

Governo do Estado do Amazonas

Governador

Wilson Miranda Lima

Universidade do Estado do Amazonas

Reitor

André Luiz Nunes Zogahib

Vice-Reitora

Kátia do Nascimento Couceiro

Editora UEA

Diretora

Isolda Prado de Negreiros

Nogueira Horstmann

Gerente

Maria do Perpetuo Socorro

Monteiro de Freitas

Editor Executivo

Wesley Sá

Produtora Editorial

Raquel Maciel

Conselho Editorial

Isolda Prado de Negreiros Nogueira

Horstmann (Presidente)

Adriana Távora de

Albuquerque Taveira

Carlos Mauricio Seródio Figueiredo

Gislaine Regina Pozzetti

Josefina Diosdada Barrera Khalil

Katell Uguen

Orlem Pinheiro de Lima

Silvia Regina Sampaio Freitas

Vanúbia Araújo Laulate Moncayo

Fotografia da capa

André Zumak

Projeto Gráfico

Raquel Maciel

Sumário

Apresentação	5
1. Climatologia da Precipitação e Temperatura	6
2. Diagnóstico Oceânico (Oceano Pacífico Equatorial e Atlântico Tropical).....	8
2.1. Prognóstico fenômeno ENOS – El Niño Oscilação Sul	8
3. Diagnóstico climático para Bacia Amazônica.....	10
4. Prognóstico Climático para Bacia Amazônica.....	13
4.1 Prognóstico de precipitação – 15 dias	16
5. Diagnóstico hidrológico das principais sub-bacia do Amazonas	17
5.1 Prognóstico hidrológico das principais sub-bacia do Amazonas	22
Síntese do prognóstico sazonal hidroclimático – LABCLIM - UEA.....	25

Apresentação

O propósito deste boletim é disponibilizar as principais informações hidroclimáticas atualizadas sobre as principais variáveis que influenciam no padrão climático no Estado do Amazonas. Essas informações têm a finalidade de serem utilizadas em diversas áreas, incluindo a navegação, agricultura, transporte, pecuária, produção industrial, entre outros setores do Amazonas. Para atender a essas necessidades, oferecemos análises diagnósticas e prognósticas a partir observações e o estado da arte em modelos climáticos e hidrológicos dos principais centros meteorológicos nacionais e internacionais. Abordamos a influência do fenômeno climático El Niño -Oscilação Sul (ENOS), bem como informações relacionadas à precipitação, temperatura, níveis de água (cota), vazão e área de inundação dos principais rios do estado. O boletim de prognóstico sazonal hidroclimático para o Amazonas é produzido pelo Laboratório de Modelagem do Sistema Climático Terrestre (LABCLIM), situado na Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (EST/UEA).

O LABCLIM corresponde a três Sistemas de Processamento Alto Desempenho “Cluster Computing”, formado pelos Clusters Tambaqui (CPU), Aruanã (CPU) e Jaraqui (GPU). Esses sistemas (clusters) permitem a integração de modelos físicos - matemáticos que representam o sistema climático terrestre e as suas variações em diferentes escalas espaciais e temporais. A aquisição do LABCLIM em 2016, financiado com recursos provenientes da Agência Nacional de Águas (ANA), por intermédio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), correspondeu a um marco no desenvolvimento de pesquisas científicas nas áreas Ambiental, Hidrologia, Climática, Variabilidade e Mudanças no Clima, entre outros, realizadas por alunos de graduação e pós-graduação na universidade.

Desde a sua implantação, o LABCLIM tem sido fundamental na formação e qualificação de alunos ao nível de graduação (iniciação científica e trabalho de conclusão de curso – TCC) e no apoio ao desenvolvimento de dissertação de mestrado e teses de doutorado por alunos de pós-graduação da Universidade do Estado do Amazonas. Além disso, diferentes projetos de pesquisas vêm utilizando a estrutura computacional do laboratório para a geração e processamento dos dados climáticos e hidrológicos na bacia Amazônica.

1. Climatologia da Precipitação e Temperatura

A Figura 1 apresenta a climatologia da distribuição espacial da precipitação para os meses de junho, julho, agosto e setembro (JJAS), com base nos dados do produto de precipitação global MSWEP (Multi-Source Weighted-Ensemble Precipitation), com resolução de 0,1°. Nesses meses, os maiores acumulados de precipitação, acima de 240 mm, concentram-se no extremo norte e noroeste da bacia Amazônica. Esse comportamento está associado à atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que se posiciona mais ao norte nessa época do ano, favorecendo a formação de nuvens convectivas sobre a região. A entrada de umidade transportada pelos ventos alísios do Atlântico Norte e a intensa evapotranspiração da floresta contribuem para manter condições favoráveis à ocorrência de chuvas. Em contrapartida, o centro-sul da bacia passa a registrar volumes reduzidos de precipitação, com valores inferiores a 140 mm, em função do recuo da ZCIT e do predomínio de massas de ar seco.

A Figura 2 apresenta a climatologia da temperatura média do ar (°C) na bacia Amazônica para o período de junho a setembro (JJAS), com base nos dados do produto South American Mapping of Temperature (SAMET). Observa-se que, em junho e julho, a maior parte da região apresenta pouca variação térmica, reflexo da alta incidência de radiação solar na superfície. Nos meses de agosto e setembro, as temperaturas médias mais elevadas, entre 28°C e 30°C, concentram-se nas porções central e oriental da bacia. Já as menores temperaturas médias, entre 22°C e 24°C, ocorrem no sul da Amazônia, especialmente em Rondônia e Mato Grosso, onde a passagem de sistemas frontais, conhecidos como friagens, contribui para quedas temporárias da temperatura. Essas variações térmicas ao longo do trimestre, associadas à redução da umidade relativa, favorecem o aumento do risco de queimadas e a intensificação de eventos de poluição atmosférica, principalmente nas regiões mais secas da bacia.

Figura 1. Climatologia de chuva (mm/mês) para os meses de junho, julho, agosto e setembro, referente ao período de 1992 a 2024 com base no produto de precipitação global do Multi-Source Weighted-Ensemble Precipitation. Fonte: MSWEP.






Figura 2. Climatologia de Temperatura (°C) para os meses de junho, julho, agosto e setembro para o período de 2000 a 2024 com base no produto de temperatura do ar South American Mapping of Temperature. Fonte: SAMET



2. . Diagnóstico Oceânico (Oceano Pacífico Equatorial e Atlântico Tropical)

A Figura 3 ilustra a Anomalia Global Diária da Temperatura da Superfície do Mar (TSM), com resolução de 5 km, fornecida pelo Coral Reef Watch (CRW) do National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), em comparação com a média climatológica. Em maio de 2025, o padrão El Niño Oscilação Sul (ENOS) neutro persistiu, caracterizado por temperaturas da superfície do mar (TSM) próximas da média ao longo da maior parte do Oceano Pacífico equatorial. Os valores mais recentes do índice Niño semanal mantiveram-se em neutralidade, com anomalia de 0,0 °C na região do Niño-3.4. Conforme os dados mais recentes disponibilizados pela NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), as anomalias de temperatura da superfície do mar (TSM) registraram valores de 0,0 °C na região Niño-4, -0,1 °C na região Niño-3 e 0,4 °C na região Niño 1+2. No Atlântico Tropical, predominam anomalias de temperatura da superfície do mar (TSM) próximas à média climatológica. No entanto, observa-se um leve aquecimento mais pronunciado na porção norte, especialmente nas proximidades das Guianas. Na linha equatorial, predominam nas últimas semanas um leve resfriamento.

Figura 3. Anomalia Global Diária da Temperatura da Superfície do Mar (TSM) de 5 km da NOAA Coral ReefWatch (CRW) indica a diferença entre a TSM atual e a média de longo prazo. Fonte: NOAA Coral ReefWatch. <https://coralreefwatch.noaa.gov/product/>.



2.1. Prognóstico fenômeno ENOS – El Niño Oscilação Sul

A Figura 4 apresenta a pluma de previsões dos modelos climáticos dinâmicos e estatísticos dos principais centros internacionais de previsão sazonal para a região do Pacífico Equatorial Central (Niño 3.4), considerando períodos móveis trimestrais. As previsões compiladas pelo International Research Institute (IRI) indicam a manutenção de condições neutras do ENOS (El Niño-Oscilação Sul) nos trimestres de junho a agosto

e de julho a setembro de 2025. De acordo com a análise probabilística integrada, que combina a saída dos modelos com a avaliação da equipe técnica do IRI (Figura 5), a probabilidade de condições de neutralidade na região do Niño 3.4 durante o trimestre junho-agosto de 2025 é de aproximadamente 74%.

Figura 4. Pluma com o prognóstico dos modelos estatísticos e dinâmicos para a ocorrência do fenômeno ENOS. Dados: <http://iri.columbia.edu>.





Figura 5. Previsão probabilística baseada em modelos estatísticos e dinâmicos para a ocorrência do fenômeno ENOS. Dados: <http://iri.columbia.edu>.



3. Diagnóstico climático para Bacia Amazônica

A Figura 6 apresenta as anomalias de precipitação (%) na bacia Amazônica para o período de fevereiro a junho de 2025, com base no produto global de precipitação MSWEP (Multi-Source Weighted-Ensemble Precipitation). Em fevereiro, a maior parte da bacia Amazônica apresentou anomalias positivas de precipitação. A exceção foi a porção sul da bacia, onde predominaram anomalias negativas, associadas à redução dos movimentos ascendentes da célula de Hadley, o que favoreceu para uma redução da convecção nessa região. Em contraste, as anomalias positivas foram favorecidas pela intensificação dos movimentos ascendentes da célula de Walker e pelo aumento do transporte de umidade do Oceano Atlântico Tropical para o interior da bacia, condições que favoreceram a formação de nuvens e precipitação. No mês de março, observou-se a persistência de anomalias positivas de precipitação nas porções oeste, sudoeste e sul da bacia Amazônica, resultado da atuação de sistemas meteorológicos como a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), a Alta da Bolívia e do contínuo transporte de umidade proveniente do Atlântico Tropical. Por outro lado, as anomalias negativas observadas na região central da bacia estiveram associadas a uma leve redução dos movimentos ascendentes da célula de Walker entre as longitudes 60°W e 68°W, o que limitou a atividade convectiva nesse setor. Em abril foram observadas anomalias positivas de precipitação na porção sudoeste e oeste da bacia Amazônica. Contudo, foram observadas anomalias negativas de precipitação na porção ocidental da bacia, associadas a redução dos movimentos ascendentes da célula de Walker e ao deslocamento anômalo da ZCIT para o hemisfério norte. Durante o mês de maio, foram observadas anomalias positivas de precipitação no oeste da bacia Amazônica. Esse padrão pode ter sido influenciado, em parte, pela atuação de um El Niño costeiro, com aquecimento anômalo das águas na região do Niño 1+2, o que favorece a convecção na porção ocidental da bacia em determinados momentos. Em contrapartida, anomalias negativas de precipitação foram registradas no centro-leste do estado do Amazonas e em grande parte do Pará, associadas a um leve resfriamento do oceano Atlântico tropical sul e ao deslocamento anômalo da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) para o hemisfério norte, resultando na redução do transporte de umidade para essas áreas.

A Figura 9 apresenta as anomalias de temperatura do ar a 2 metros (°C) na bacia Amazônica para o período de fevereiro a maio de 2025, com base no produto South

American Mapping of Temperature (SAMET). No mês de fevereiro, foram observadas anomalias negativas, em torno de $-1\text{ }^{\circ}\text{C}$, na porção oeste da bacia e no estado do Amazonas, enquanto anomalias positivas ocorreram na porção sul, especialmente em Rondônia. Padrões similares foram registrados nos meses de março e abril, embora com anomalias menos intensas. Em maio, destacaram-se anomalias positivas mais intensas, superiores a $1\text{ }^{\circ}\text{C}$, em grande parte do sul da bacia, além de anomalias negativas em pontos isolados, como em Roraima e no extremo oeste da Amazônia.

Figura 6. Anomalia de precipitação (%) na bacia Amazônica para os meses de fevereiro a maio de 2025 proveniente do produto de precipitação global. Fonte: MSWEP.




Figura 7. Superior: climatologia (azul) e anomalia (vermelho) do movimento vertical meridional (entre 60°N e 40°W) em maio de 2025. Inferior: Média do movimento vertical observado. Esquerda: anomalias de precipitação (mm). Dados do CPC/NCEP e MSWEP processados pelo LABCLIM-UEA.




Figura 8. Superior: Climatologia (azul) e anomalia (vermelho) do movimento vertical zonal (entre 5°N e 10°S) em maio de 2025. Centro: Média do movimento vertical observado. Inferior: anomalias de TSM (°K) e precipitação (mm). Dados do CPC/NCEP e MSWEP processados pelo LABCLIM-UEA.

Walker 5N-10S Climatologia/Anomalia MAY/2025





Figura 9. Anomalia de Temperatura do Ar a 2m (°C) na bacia Amazônica para os meses de fevereiro a maio de 2025, provenientes do produto South American Mapping of Temperature (SAMET).



4. Prognóstico Climático para Bacia Amazônica

As Figuras 10 e 11 apresentam as previsões de precipitação para a bacia Amazônica no período de junho a agosto de 2025 (JJA), baseadas nos modelos sazonais NMME (North American Multi-Model Ensemble) — que integra os modelos acoplados da NOAA/NCEP, NOAA/GFDL, IRI, NCAR, NASA e Canada's CMC — e no ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts). As previsões do modelo sazonal NMME (Figura 10) indicam a ocorrência de chuvas abaixo da média para o mês de junho na porção norte do continente sul-americano. Em contrapartida, são previstas precipitações acima da média na região central do estado do Amazonas e do Pará. Para o mês de julho, o modelo prevê anomalias positivas de precipitação na faixa que vai do oeste da bacia e estende-se até o leste da bacia, porém no norte da bacia prevê-se chuvas abaixo da média. Já em agosto, o NMME prevê precipitações abaixo da média sobre o estado de Roraima e norte do Pará. O modelo sazonal ECMWF (Figura 11) apresenta previsões semelhantes às do NMME. Para junho, o modelo europeu prevê anomalias

positivas nas regiões noroeste, oeste, sudoeste e central da bacia e anomalias negativas no norte do estado do Pará. Em julho e agosto, as previsões mostram que as chuvas poderão ficar acima da média na região central, sudeste do estado do Amazonas e sudoeste do estado do Pará.

As previsões das anomalias de temperatura do ar a 2 metros ($^{\circ}\text{C}$), geradas pelos modelos climáticos sazonais do North American Multi-Model Ensemble (NMME) e pelo modelo sazonal do European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), são apresentadas nas Figuras 12 e 13, respectivamente, para o período de junho a agosto de 2025 (JJA). Ambos os modelos indicam a predominância de anomalias positivas de temperatura do ar nas regiões ao sul da bacia Amazônica durante os meses de junho a agosto, abrangendo o sul do estado do Amazonas, Rondônia, sul do Pará e o Acre.

Figura 10. Previsões sazonais de anomalias de precipitação (mm/mês) do North American Multi-Model Ensemble (NMME) para os meses de junho a setembro de 2025 (JJAS). Fonte dos dados: NMME.




Figura 11. Previsões sazonais de anomalias de precipitação (mm/mês) do European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) para os meses de junho a setembro de 2025 (JJAS). Fonte dos dados: ECMWF.




Figura 12. Previsões sazonais de anomalias de Temperatura (°C) do North American Multi-Model Ensemble (NMME) para os meses de junho a setembro de 2025 (JJAS). Fonte dos dados: NMME.





Figura 13. Previsões sazonais de anomalias de Temperatura (°C) do European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) para os meses de junho a setembro de 2025 (JJAS). Fonte dos dados: ECMWF.




4.1 Prognóstico de precipitação – 15 dias

A Figura 14 apresenta a previsão do acumulado de precipitação do modelo Global Ensemble Forecast System (GEFS) do National Centers for Environmental Prediction (NCEP), com resolução espacial de 5 km, ajustada com dados de estimativa de precipitação do CHIRPS (Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data), para a bacia Amazônica no período de 06/06/2025 a 20/06/2025.

Durante o período em análise, as previsões do modelo GEFS indicam que os maiores totais acumulados de precipitação, variando entre 150 mm e 270 mm, deverão se concentrar sobre o oeste da bacia Amazônica, especialmente nas regiões dos rios Napo, Içá, alto rio Negro, alto Solimões, Javari e Juruá. Nas demais áreas da bacia, os volumes de precipitação previstos são inferiores, podendo alcançar até 90 mm.

Figura 14. Previsão do acumulado de precipitação do modelo Global Ensemble Forecast System (GEFS) do National Centers for Environmental Prediction (NCEP), com resolução espacial de 5 km, ajustada com dados de estimativa de precipitação do CHIRPS (Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data). **Fonte:** GEFS-CHIRPS.




5. Diagnóstico hidrológico das principais sub-bacia do Amazonas

Utilizando dados da Agência Nacional de Águas (ANA) e o diagnóstico realizado pelo Serviço Geológico Brasileiro (SGB) apresenta-se a seguir a situação dos níveis dos rios (cotagramas) para diferentes bacias hidrográficas da Amazônia.

a) Rio Solimões

Em 12 de junho de 2025, a cota do rio Solimões em Tabatinga (Alto Solimões) foi registrada em 12,28 metros, apresentando uma variação diária negativa de 4 centímetros em relação ao dia anterior (12,32 m). Apesar da tendência de estabilidade nas últimas semanas, os níveis seguem acima dos valores observados no mesmo período de 2024, mas ainda dentro da faixa considerada normal para esta época do ano, conforme indicado pela curva de permanência histórica. A diferença em relação à cota máxima histórica registrada no local — 13,82 metros, em 28 de maio de 1999 — é de 1,54 metros.


Figura 15. Cotagrama da estação fluviométrica de Tabatingana bacia do rio Solimões.
Fonte: ANA.



b) Rio Negro

Em 12 de junho de 2025, a cota do rio Negro em Manaus (Baixo Rio Negro) foi registrada em 28,77 metros, apresentando uma elevação de 2 centímetros em relação ao dia anterior (28,75 m). O nível atual permanece dentro da faixa considerada normal para o período, segundo a curva de permanência histórica, e está 1,25 metros abaixo da cota máxima histórica registrada na estação — 30,02 metros, em 16 de junho de 2021.


Figura 16. Cotograma do rio Negro em Manaus. Fonte: ANA.



c) Rio Purus

Em 12 de junho de 2025, a cota do rio Purus em Beruri (Baixo Purus) foi registrada em 20,96 metros, com uma elevação de 3 centímetros em relação ao dia anterior (20,93 m). O nível atual segue dentro do intervalo considerado normal para esta época do ano, conforme a curva de permanência histórica, e está 1,40 metros abaixo da cota máxima histórica registrada na estação — 22,36 metros, em 24 de junho de 2015.


Figura 17. Cotagrama do rio Purus em Beruri. Fonte: ANA.



d) Rio Madeira

Em 12 de junho de 2025, a cota do rio Madeira em Humaitá (Médio Madeira) foi registrada em 19,07 metros, apresentando uma acentuada redução de 19 centímetros em relação ao dia anterior (19,26 m). Apesar de ainda se manter dentro da faixa típica para esta época do ano, o nível atual está 6,56 metros abaixo da cota máxima histórica registrada na estação — 25,63 metros, em 9 de abril de 2014.


Figura 18. Cotograma do rio Madeira em Humaitá. Fonte: ANA.



e) Rio Amazonas

Em 12 de junho de 2025, a cota do rio Amazonas em Itacoatiara (Médio Amazonas) foi registrada em 14,40 metros, apresentando uma leve redução de 1 centímetro em relação ao dia anterior (14,41 m). O nível atual encontra-se dentro da faixa esperada para o período, conforme indicado pela curva de permanência histórica, e está 0,80 metros abaixo da cota máxima histórica registrada na estação — 15,20 metros, em 27 de maio de 2021.

Figura 19. Cotograma do rio Amazonas em Itacoatiara. Fonte: ANA.



5.1 Prognóstico hidrológico das principais sub-bacia do Amazonas

Nesta seção são apresentadas as previsões de um conjunto de dados dos níveis (cota) do rio Madeira para os próximos quatro meses com o modelo hidrológico MGB-IPH forçado com os conjuntos de previsões sazonais do modelo sazonal do ECMWF produzido pelo LABCLIM. As Figuras 20 a 25 apresentam as previsões de nível (cota) para os meses de maio a julho de 2025 nas estações de Ji-Paraná, Porto Velho, Manicoré e Humaitá, localizadas na bacia do rio Madeira. As simulações foram geradas com o modelo hidrológico MGB-IPH, forçado com os campos de precipitação previstos pelos modelos sazonais do ECMWF.

Para as estações de Ji-Paraná, Porto Velho, Humaitá e Manicoré, as previsões hidrológicas indicam a continuidade do processo de recessão dos níveis fluviométricos ao longo dos meses de junho e julho, caracterizando o período de vazante nas respectivas regiões da bacia do rio Madeira. Apesar da tendência de redução, os níveis previstos

devem permanecer acima das médias climatológicas históricas para o período, sugerindo uma vazante menos acentuada do que o habitual.

Figura 20. Previsões sazonais de níveis (cota) para a estação de Ji-Paraná com base nos dados do modelo hidrológico MGB-IPH forçado com os dados do modelo sazonal do ECMWF e do modelo sazonal Eta - INPE.




Figura 21. Previsões sazonais de níveis (cota) para a estação de Porto Velho com base nos dados do modelo hidrológico MGB-IPH forçado com os dados do modelo sazonal do ECMWF.




Figura 22. Previsões sazonais de níveis (cota) para a estação de Manicoré com base nos dados do modelo hidrológico MGB-IPH forçado com os dados do modelo sazonal do ECMWF.





Figura 23. Previsões sazonais de níveis (cota) para a estação de Humaitá com base nos dados do modelo hidrológico MGB-IPH forçado com os dados do modelo sazonal do ECMWF.



Síntese do prognóstico sazonal hidroclimático – LABCLIM - UEA

Em maio de 2025, o padrão neutro do fenômeno El Niño-Oscilação Sul (ENOS) foi mantido, com temperaturas da superfície do mar (TSM) próximas à média climatológica em grande parte do Oceano Pacífico equatorial. Os valores mais recentes do índice Niño-3.4 semanal variaram entre $-0,2\text{ °C}$ e $0,0\text{ °C}$, reforçando a ausência de aquecimento ou resfriamento significativos nessa região. De acordo com os dados atualizados pela NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) no início de junho, as anomalias de TSM nas demais regiões do Niño apresentaram os seguintes valores: $0,0\text{ °C}$ na região Niño-4, $-0,1\text{ °C}$ na Niño-3 e $+0,4\text{ °C}$ na região Niño 1+2, caracterizando um padrão predominantemente neutro em todo o Pacífico equatorial. No Atlântico Tropical, observam-se anomalias de TSM próximas à climatologia nas porções norte e sul, no entanto, a faixa equatorial exibe um padrão de resfriamento que vem persistindo nas últimas semanas. Esse padrão oceânico contribui para o posicionamento mais ao norte da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), favorecendo o aumento do transporte de umidade em direção à porção norte da bacia Amazônica, o que pode resultar em volumes de precipitação acima da média nessa região ao mesmo tempo em que contribui negativamente para a umidade que adentra o continente pelo norte do Pará. Diante desse cenário, o prognóstico para o trimestre junho-julho-agosto:

a) Precipitação - Chuva:

– Em junho, as chuvas devem ficar acima da média climatológica no Noroeste, oeste da bacia e centro do estado do Amazonas. Roraima, Amapá e norte do Pará devem ficar abaixo da média climatológica, influenciadas pelo posicionamento mais ao norte da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e resfriamento na faixa equatorial do Atlântico. Nas demais áreas da bacia, o padrão apresentado é de normalidade.

– Nos meses de julho e agosto, as chuvas devem permanecer próximas a média climatológica na maior parte da bacia Amazônica. No entanto é necessário um monitoramento contínuo do padrão de resfriamento em desenvolvimento no Atlântico equatorial.

b) Previsão de chuva para 15 dias:

– Para os próximos 15 dias, as previsões do modelo GEFS indicam que os maiores acumulados de precipitação (150 a 270 mm) deverão se concentrar no oeste da bacia Amazônica, abrangendo áreas dos rios Napo, Içá, alto rio Negro, alto Solimões, Javari e Juruá. Nas demais regiões da bacia, os volumes previstos são inferiores, com acumulados de até 90 mm.

c) Temperaturas:

– As temperaturas do ar deverão ficar acima da média climatológica em grande parte da bacia Amazônica no mês de maio, exceto na região noroeste. Em junho e julho as regiões sul e sudeste da bacia deverão ficar com temperaturas acima da média.

d) Níveis dos rios:

– **Madeira:** As previsões hidrológicas indicam que, entre junho e julho, Ji-Paraná, Porto Velho, Humaitá e Manicoré continuarão em processo de vazante, com níveis fluviométricos em recessão. No entanto, os níveis devem permanecer acima da média climatológica, indicando uma vazante menos intensa que o padrão histórico.